

OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATINING STOMATITINING TURLI SHAKLLARINI DAVOLASH USULLARINING SAMARADORLIGI.

Normatov M.A

Ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrası assistenti

Andijon davlat tibbiyot instituti

Andijon shahri

Tadqiqotning dolzarbligi. Ko'pgina tadqiqotchilar stomatitni saratondan oldingi holat deb hisoblashadi, uni davolash murakkab va hal qilinmagan muammo bo'lib qolmoqda. Bemorlar soni har yili ortib bormoqda va davolanish natijasini qoniqarli deb bo'lmaydi. Uzoq muddatli konservativ davo ko'pincha bemorlarning to'liq tiklanishiga kafolat bermaydi va og'iz bo'shlig'ining anatomik tuzilishining murakkabligi va patologik jarayonning tarqalishi tufayli qo'llaniladigan jarrohlik usullari har doim ham mumkin emas.

Tadqiqot maqsadi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining stomatitining turli shakllarini davolash usullarining samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot ob'ekti, hajmi va usullari. Ushbu patologiyani davolash uchun 2018 yildan 2024 yilgacha konservativ va fizik davolash usullaridan foydalandik. Qoidaga ko'ra, davolash bir necha bosqichda olib borildi. Bizning nazoratimizda 100 nafar bemor bor edi

Birinchi guruh davolashning birinchi bosqichida konservativ terapiya o'tkazgan 60 nafar bemordan iborat edi. Ikkinchi guruhga lazerli destruksiya qilingan 20 bemor kirdi. Uchinchi guruh 20 kishidan iborat edi. Ular kriodestruksiyadan o'tdilar.

Natijalar. Birinchi guruhda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining stomatitsining konservativ terapiyasidan so'ng 25 holatda 100% regressiya qayd etildi, bu 42,6% ni tashkil etdi. 27 ta holatda (45,9%) regressiya darajasi 50% dan oshmagan, qolgan 8 ta holatda (11,4%) davolash samarasiz bo'lgan. Konservativ terapiyaning profilaktik kurslari o'tkazilgan. Uchinchi guruhda kriyojenik davolashdan so'ng 40 bemorda (89,1%) ikki yil davomida kasallikning qaytalanishi belgilari yo'q edi.

Xulosalar. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining stomatitsining turli shakllari bilan og'rikan 100 nafar bemorni davolash tahlilini yakunlar ekan, shuni ta'kidlash kerakki, 60 holatda (89,7%) barqaror davolanishga erishildi. Shu bilan birga, konservativ terapiyadan so'ng bemorlarda 20 ta holatda (29,5%), lazerni yo'q qilish - 37 (92,5%) va kriodestruksiya - 41 (89,1%).

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Atakhonov Azizbek Abdisalamovich. (2023). OBSERVATION OF INDICATORS OF PROSTHETIC STOMATITIS IN PATIENTS USING PROSTHESES MADE OF ETHACRYL AND FTOROX. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).
2. Atakanov Azizbek Abdisolomovich. (2023). AESTHETIC REQUIREMENTS IN CHOOSING ARTIFICIAL TEETH. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 10(11), 98–100.
3. А.А. Атахонов. (2023). Frequency of Occurrence and Clinical Manifestations of Stomatitis in Patients After Acrylic Prosthetics. Eurasian Medical Research Periodical, 2023/04/05, Том 19, Номер 14 Страницы 1-3.
4. Ataxanov Azizbek Abdusalomovich.(2022). BOLALARDA OG'IZ BO'ZISH SHILLIQ QATLAMI KASALLIKLARI TUZILISHINI YOSH BO'YICHA XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук. Том 2 Номер 3 Страницы 77-80 .
5. Atakhonov Azizbek Abdisalamovich.(2024). International Multidisciplinary Journal for Research & Development. Том 11. Номер 04 Страницы 260-262.
6. Azizbek Ataxanov. (2023) . ANDIJON VILOYATIDA YASHOVCHI BOLALARDA GINGIVITNING TARQALISHINI O'RGANISH. Евразийский журнал медицинских и естественных наук. Том 3 Номер 4 Страницы 88-91.