

TISHNING PERIODONT TO'QIMASI

Ovloyorov O'lmasbek

Buxoro Innovatsion Ta'llim va Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Bu maqolada tishning periodont to'qimasi o'r ganib chiqilgan

Kalit so'zlar: periodont, kimyoviy ta'siri, infeksiyali.

Periodontit (peri... va yun. odontos — tish), peritsementit — tish ildizi atrofidagi to'qimalar (periodont)ning yallig'lanishi.

Periodontitlarni kelib chiqishiga ko'ra infeksiyali, jarohatli va kimyoviy turlarga bo'linadi.

Infeksiyali periodontitni kelib chiqishida streptokok mikroblari asosiy o'ren tutadi. Mikroblar va chirigan pulpa toksinlari ildiz kanali yoki milk cho'ntagi orqali periodontal yoriqqa kelib tushadi. Kamdankam hollarda infeksiya qon va limfa orqali kirib kelishi mumkin (gripp, tif va boshqalar).

Shikastlanish jarayonida hosil bo'lgan periodontit tishga bir zumli shikast (zarb) va bir necha bor ta'sir etuvchi mikro shikastlar

(prikujni ko'taruvchi plomba, qoplama), zararli odatlar (qalamni tish qatorida ushslash, tishlarda mix ushslash) kabi ta'sirlar natijasida paydo bo'ladi.

Kimyoviy ta'sirdan kelib chiquvchi periodontit arsenat pasta, formalin, fenollar ta'sirida kelib chiqadi. Kasallikning klinik kechishiga

ko'ra o'tkir va surunkali periodontitlar bir biridan farqlanadi. Yallig'lanishning joylashishiga ko'ra ildiz uchi — apikal va ildiz

chetlarga bo'linadi. O'tkir periodontitlar ekssudatiga ko'ra o'tkir seroz va o'tkir yiringliliga bo'linadi. Surunkali ildiz uchi periodontitlari periodont to'qimasini zararlanish xarakteri va darajasiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

1. Surunkali fibroz;
2. Surunkali granulatsiyalovchi periodontit;
3. Surunkali granulematoz periodontit.

Surunkali periodontitlar noxush tashqi muhit ta'sirida o'tkirlashishi kuzatiladi. Shunga asoslangan holda surunkali periodontit huruji ham farqlanadi.

O'tkir ildiz uchi periodontit

Bemor keskin, doimiy chegaralangan og'riqdan shikoyat qiladi. Og'riqlarning kuchi qizarish darajasiga, shishning hajmiga va ekssudatga bog'liq. Kasallikning boshlanishida og'riqlar sust, simillovchi bo'lib, sababchi tish atrofida bo'ladi. So'ng og'riqlar kuchli, irradiatsiyalovchiga aylanadi. Ko'pchilik avtorlarning fikriga ko'ra bunday og'riq ekssudatning yiringli formasiga o'tganligidan dalolat beradi. Ildiz uchidagi o'tkir zaharlanish 2-3 kundan ikki haftagacha davom etadi. O'tkir periodontitni shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin.

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI¹²¹

30-MAY

ANDIJON,2024

Birinchi bosqich Pulpitni o‘z vaqtida yoki xato davolash oqibatida kelib chiqadi. Bu bosqich uchun davomli, simillovchi og‘riqlar xarakterli. Ayrim hollarda sababchi tishni tishlab bositganda ham og‘riqlar paydo bo‘ladi. Sababchi tish atrofidagi milkning holati o‘zgarmaydi. Vertikal perkussiyada periodontning sezuvchanligi aniqlanadi.

Ikkinci bosqichda Bu bosqichda ekssudatlanish jarayoni ortib boradi. Og‘riqlar doimiy bo‘lib sekin-asta kuchayib boradi. Kasallangan tishni tishlab bositganda og‘riqlar zo‘rayadi, hatto tilning tegib ketishi ham og‘riqlarni kuchaytiradi. Perkussiya keskin og‘riqli bo‘ladi. Tish qimirlab qoladi va xuddi o‘sib qolganga o‘xshaydi. Tish atrofidagi milk qizaradi, shishadi, palpatsiyada tishning ildiz uchi sohasi og‘riqli bo‘ladi. Pulpa nekrozga uchragani uchun tish termik ta’sirlardan, elektr taassurotlardan ta’sirlanmaydi. Ayrim hollarda jag’ atrofi to‘qimalarida shish kuzatiladi. Infiltrat yoki assess hisobiga o‘tuv burma yassilashadi. Bu holda perkussiya kuchsiz og‘riqli bo‘lib palpatsiya keskin og‘riqga aylanadi. Palpatsiyada flyuktuatsiya aniqlanishi mumkin. Yiringli ekssudatning yorib chiqishi natijasida milk va yuz shishlari kichrayadi, og‘riqlar esa susayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.A. Tashpulatova. Stomatologik kasalliklar. «Fan va texnologiya» 2016.
2. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil